

# COSOMMINISTRAZIONI

VACCINI	INFLUENZA Inattivato/ Alto dosaggio	INFLUENZA adiuvato	PREVENAR 13	PNEUMOVAX	ZOSTAVAX	SHINGRIX	COVID 19
INFLUENZA Inattivato/Alto dosaggio			SI	SI	SI	SI	SI
INFLUENZA adiuvato			SI	SI	SI	NO (intervallo di almeno 2 settimane)	SI
PREVENAR 13	SI	SI		NO	SI	SI	SI
PNEUMOVAX	SI	SI	NO		SI	SI	SI
ZOSTAVAX	SI	SI	SI	SI			SI
SHINGRIX	SI	NO	SI	SI			SI
COVID 19	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

- SE I VACCINI INATTIVATI PER CUI LA COSOMMINISTRAZIONE E' POSSIBILE (IN QUANTO NON CONTROINDICATA IN SCHEDA TECNICA) NON VENGONO SOMMINISTRATI CONTEMPORANEAMENTE LA VACCINAZIONE SUCCESSIVA SI PUO' EFFETTUARE IN QUALSIASI MOMENTO (fanno eccezione alcuni vaccini come da tabella).
- SE 2 VACCINI VIVI NON VENGONO COSOMMINISTRATI, DEVONO ESSERE EFFETTUATI AD UN INTERVALLO DI ALMENO 4 SETTIMANE L'UNO DALL'ALTRO.